

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Йодопена® для лечения и профилактики
послеродовых эндометритов у коров и свиноматок
(организация-разработчик: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, г. Саратов,
ул. им. Осипова, В.И., дом 1)

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата: Йодопен® (Iodopen).
Международное непатентованное наименование: повидон-йод
2. Лекарственная форма: суппозитории для внутриматочного введения.
В 1 суппозитории Йодопена® содержит в качестве действующего вещества 1,5 г йодповидона (1,57% активного йода), в качестве вспомогательных веществ: натрия гидрокарбонат, ПЭГ-1500, стеарат кальция, фумаровую кислоту и лактозу.
3. По внешнему виду препарат представляет собой суппозитории коричневого цвета цилиндрической или эллипсоидной формы, твердой консистенции, со слабым запахом йода. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 18 месяцев со дня производства. Вскрывать блистеры с суппозиториями необходимо непосредственно перед их использованием, после вскрытия упаковки препарат хранению не подлежит. Запрещается применение Йодопена® по истечении срока годности.
4. Суппозитории Йодопен® выпускают расфасованными по 2 штуки в блистеры из фольги ламинированной, которые по 5 блистеров помещают в картонную пачку. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 4°C до 25°C.
6. Йодопен® следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Йодопен® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Йодопен® относится к фармакотерапевтической группе «Антисептики и дезинфицирующие средства», обладает антимикробным, противовоспалительным и обезболивающим действием, улучшает пролиферативные процессы в половых органах, сокращает сроки выздоровления животных.

10. Йод, входящий в состав Йодопена[®], соединяется с белками микробной клетки, блокируя ее дыхательные ферменты.

Йодопен[®] по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Йодопен[®] применяют для лечения и профилактики воспалительных процессов матки после родовспоможения при осложненных и патологических родах, после оперативного отделения последа, аборт, при острых послеродовых эндометритах.

12. Противопоказаниями для применения могут послужить индивидуальная непереносимость и повышенная чувствительность к йоду и/или компонентам препарата, гипертиреоз.

13. Суппозитории вводят в полость матки рукой, одетой в полиэтиленовую перчатку разового использования. Перед введением Йодопена[®] проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста.

Йодопен[®] вводят внутриматочно по одному суппозиторию:

- с лечебной целью двукратно с интервалом 24-48 часов, в особых случаях лечение повторить;

- с профилактической целью однократно сразу после отделения последа, аборта или родовспоможения.

Не рекомендуется одновременно вводить два суппозитория лекарственного препарата.

14. При передозировке препарата животному необходимо назначить дезинтоксикационную и симптоматическую терапию.

15. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

16. Препарат не применяется беременным животным. Ограничения к использованию во время лактации отсутствуют.

17. При пропуске приема одной или нескольких доз препарата применение следует возобновить как можно быстрее в предусмотренных дозировках и схеме применения. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

18. Побочных явлений и осложнений в период применения Йодопена[®] в соответствии с инструкцией по применению не установлено.

Возможно проявление местной гиперчувствительности к йоду в виде зуда (что проявляется беспокойством животного) и гиперемии наружных половых органов. Эти симптомы требуют прекращения использования препарата и исчезают самостоятельно, не требуя дополнительного лечения.

19. Применение Йодопена[®] не исключает применения других лекарственных препаратов системного действия (стимулирующих тонус и сократительную деятельность матки). Лекарственный препарат нельзя применять одновременно с другими препаратами для внутриматочного введения. Не следует применять препарат в комплексе с другими местно-дезинфицирующими средствами, содержащими ртуть, окислители, щелочи и катионные поверхностно-активные вещества, а также одновременно с препаратами, в состав которых входят ферменты.

20. Молоко, полученное от коров во время лечения и в течение 24 часов после последнего введения Йодопена[®], используют в корм животным после кипячения.

Использование молока в пищу людям разрешается не ранее, чем через 24 часа после последнего введения Йодопена®. Мясо используется без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При применении Йодопена® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Йодопеном®. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).