

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата ветеринарного «Диоксидин 1%»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Диоксидин 1 % - Dioxydinum 1 %.

1.2 В 100 см³ препарата содержится 1 г диоксилина и растворитель.

1.3 По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость зеленовато-желтого цвета. В процессе хранения допускается выпадение в осадок кристаллов диоксилина, которые растворяются при нагревании.

1.4 Препарат упаковывают в стеклянные флаконы по 50, 100, 200 см³. Флаконы с препаратом укупоривают резиновыми пробками и обкатывают металлическими колпачками.

1.5 Препарат хранят в упаковке изготовителя в защищенном от света месте при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С.

1.6 Срок годности препарата 2 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Диоксидин - антибактериальное средство широкого спектра действия из группы производных хиноксалина. Противомикробное и химиотерапевтическое действие диоксилина связано с его способностью ингибировать биосинтез клеточной стенки микроорганизмов.

2.2 Диоксидин эффективен в отношении стафилококков, стрептококков и грамотрицательных бактерий (*Escherichia* spp., *Proteus* spp., *Klebsiella* spp., *Shigella* spp., *Salmonella* spp., *P.aeruginosa*, *P.multocida*), к нему чувствительны многие анаэробы, такие как *Clostridium* spp., *Bacteroides* spp.(включая *B.fragilis*), а также актиномицеты.

2.3 Диоксидин действует бактерицидно на бактерии, устойчивые к антибиотикам и другим химиотерапевтическим препаратам.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Препарат применяют в ветеринарии для лечения серозных, катаральных и гнойно-катаральных форм маститов у коров, метритов, эндометритов, для лечения тяжелых гнойно-воспалительных процессов различной этиологии: гнойных плевритов абсцесса легких, перитонитов, циститов, ожогов, гнойных и трофических ран, ран с наличием глубоких полостей: абсцессов мягких тканей, флегмон и др.

3.2 Перед введением препарата секрет (молоко, экссудат) из больной доли вымени тщательно выдаивают и дезинфицируют сосок. При лечении ранних расстройств секреции в больную долю вымени вводят 10,0 см³ с интервалом 8 – 12 ч в течение 2 суток. При скрытых маститах вводят 20,0 см³ два раза в сутки в течение 3 - 4 суток. При лечении хронических маститов препарат вводят в больную долю вымени в дозе 30,0 см³ с интервалом 12 ч в течение 5 – 8 суток. Перед применением содержимое флакона подогревают до 36-39 °С. После введения препарата проводят легкий массаж соска снизу вверх.

3.3 Для профилактической санации вымени на 4 день с начала сухостойного периода, препарат вводят однократно во все доли вымени по 30,0 см³.

3.4 Для лечения эндометритов препарат вводят внутриматочно, в дозе 200,0 см³ 1 раз в сутки в течение 3-5 суток или в паравагинальную клетчатку в дозе 10,0-20,0 см³ на 100 кг массы с интервалом 72 ч, до выздоровления. При введении в паравагинальную клетчатку дозу препарата разводят с равным объемом стерильного 5 % раствора глюкозы.

С профилактической целью препарат вводят внутриматочно, однократно в дозе 100,0 см³.

3.5 При отежной болезни поросят препарат вводят внутривбрюшинно в дозе 0,5 см³ на

1 кг массы в 2 приема, через каждые 12 ч.

3.6 При перитонитах препарат вводят внутривентрально в дозе 0,6 см³ на 1 кг массы в 2 приема.

3.7 При септических процессах и тяжело протекающих бактериальных инфекциях препарат применяют внутривенно в дозе 5,0 см³ на 10 кг массы в 2 приема, через каждые 12 ч. Препарат вводят с равным объемом стерильного 5 % или 40 % раствора глюкозы. Длительность лечения зависит от течения заболеваний и эффективности лечения.

3.8 Абсцессы, флегмоны, фурункулы вскрывают и промывают диоксидином, затем накладывают салфетку, пропитанную препаратом.

Раны орошают и накладывают на пораженную поверхность салфетку, пропитанную препаратом.

3.9 Побочные действия. В редких случаях у животных, с повышенной чувствительностью к диоксидину, возможны аллергические реакции.

3.10 Во время лечения молоко (секрет) из больных четвертей вымени сдаивают, обеззараживают и уничтожают. Молоко из остальных четвертей вымени подвергают кипячению и выпаивают животным.

3.11 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя мясо используют на корм плотоядным животным. Молоко используют в пищу через 24 ч после последнего введения препарата, при условии полного отсутствия признаков мастита.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19^а) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ОАО «БелВитунифарм»

211309, д. Должа, ул. Советская д. 26А, Витебский р-н и обл., Республика Беларусь.

Инструкция разработана специалистами ОАО «БелВитунифарм» (Зайцев В.В., Шапкова Ю.А., Коновалова И.И.).

