

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Лимоксин – 25 спрея для лечения ран,
заболеваний кожи и копыт у животных

(организация-разработчик фирма «Interchemie werken
«De Adelaar» B.V.», Нидерланды)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Лимоксин-25 спрей (Limoxin -25 Spray).

Международное непатентованное наименование: окситетрациклин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения в аэрозольной упаковке.

Лимоксин-25 спрей в качестве действующих веществ в 1 мл содержит окситетрациклина гидрохлорид – 25 мг и генцианвиолет – 5 мг, а также вспомогательные вещества: спирт бензиловый – 0,01 мл, спирт изопропиловый – до 1 мл, бутан, пропан. Не содержит озоноразрушающих веществ. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость фиолетового цвета.

3. Выпускают Лимоксин-25 спрей расфасованным по 200 мл в алюминиевом баллоне с распылительной головкой.

4. Хранят и транспортируют Лимоксин-25 спрей в закрытой упаковке производителя, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

5. Лимоксин-25 спрей следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Лимоксин-25 спрей относится к комбинированным антибактериальным лекарственным препаратам для наружного применения.

Окситетрациклина гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антибактериального действия, подавляет рост и развитие большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе стрептококков, стафилококков, эшерихий, сальмонелл, пастерелл, клостридий,

актинобактерий, а также некоторых видов микоплазм, риккетсий, хламидий и простейших.

Механизм бактериостатического действия основан на подавлении синтеза белков микробной клетки (блокада функции рибосом) и блокаде синтеза РНК.

Генцианвиолет относится к группе анилиновых красителей и обладает анти-септическими свойствами.

Лимоксин-25 спрей по степени воздействия на организм относится к мало-опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает кожно-раздражающим действием, при попадании в глаза вызы-вает раздражение.

III. Порядок применения

8. Лимоксин-25 спрей применяют наружно всем видам сельскохозяйствен-ных животных, собакам и кошкам для лечения инфицированных ран, ссадин, цара-пин, поражений кожи и копыт (в комплексной терапии некробактериоза), вызван-ных чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами

9. Противопоказанием к применению Лимоксин-25 спрея является индиви-дуальная повышенная чувствительность животного к тетрациклинам.

10. Перед применением лекарственного препарата с обрабатываемой по-верхности следует удалить загрязнения, некротизированные ткани, гной и раневой экссудат, а затем наносят на пораженную поверхность, распыляя Лимоксин-25 спрей с расстояния 15-20 см от пораженной поверхности в течение 1-2 секунд.

Обработку проводят 1-2 раза в сутки. Продолжительность лечения зависит от тяжести и скорости заживления, но не должна превышать 10 дней.

Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо провет-риваемом помещении. При лечении поражений в области головы следует предот-вратить попадание препарата в глаза.

11. Симптомы передозировки препарата не выявлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке и по той же схеме применения.

14. При применении Лимоксин-25 спрея в соответствии с настоящей инст-рукцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При по-вышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарст-венного препарата его использование прекращают.

15. Применение Лимоксин-25 спрея не исключает использования других ле-карственных средств этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

16. Продукция животного происхождения при вынужденном убое во время и после применения Лимоксин-25 спрея используют без ограничений, за исключени-ем обработанных препаратом поверхностей кожи, которые необходимо удалить с туши и утилизировать.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Лимоксином-25 спреем следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Лимоксин-25 спреем. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые баллоны из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель фирма «Interchemie werken «De Adelaar» B.V.» Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Netherlands

Инструкция разработана фирмой «Interchemie werken «De Adelaar» B.V.», Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Netherlands.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Лимоксин-25 спрея, утвержденная Россельхознадзором 20 ноября 2006 года.