

# Инструкция по применению ветеринарного препарата

## Кальценон, раствор для инъекций, 100 мл

**Глава 1 «Общие положения»** — краткое описание препарата, формы его выпуска, сведения об этикетировании и маркировке препарата, способах упаковки, хранения и транспортировки, методы уничтожения бракованного или неиспользованного/недоиспользованного ветеринарного препарата.

### Описание

Прозрачный раствор от едва желтого до желтого с коричневатым оттенком окрашивания.

### Фармакологические свойства

**АТС-vet классификационный код: QA12 — препараты минералов.** Действие препарата Кальценон определяется эффектом компонентов, входящих в его состав.

Кальций стимулирует функцию сердечно-сосудистой системы, способствует снижению дисперсности белка, проницаемости кровеносных сосудов, активирует процессы свертывания крови, участвует в формировании костной ткани (предупреждает риск развития рахита и остеодистрофии), регулирует процессы нервной проводимости и мышечных сокращений. Обладает общеукрепляющим, антиоксидантным эффектом.

Фосфор является составной нуклеопротеидов и фосфолипидов, стимулирует процессы ассимиляции, положительно влияет на обмен веществ в тканях организма.

Магний способствует обмену фосфора и углеводов в качестве кофактора. Его недостаточность в организме животных вызывает повышенную возбудимость. При комплексном введении магний блокирует нервно-мышечную трансмиссию и предупреждает развитие судорог.

### Состав на 100 мл. Действующие вещества:

кальция глюконат — 32,82 г;

кальция глицерофосфат — 8,13 г;

магния хлорид гексагидрат — 4,18 г.

**Вспомогательные вещества:** кислота борная, натрия цитрат, вода для инъекций

### Форма выпуска

Раствор в стеклянных бутылках по 100 мл.

### Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Условия транспортировки

Транспортировка и хранение ветеринарного препарата Кальценон, раствор для инъекций, 100 мл проводится в условиях, определенных в соответствии со спецификацией готового препарата и требованиями статьи 24-2 и 24-3 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года N 339 (с изменениями от 24.07.2009 № 190-IV (порядок введения в действие см. ст. 2) в закрытых транспортных средствах и всеми видами транспорта и правилами перевозки грузов. Препарат следует транспортировать и хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 25 °C.

### Срок годности

2 года.

### Методы уничтожения бракованного или неиспользованного/недоиспользованного ветеринарного препарата

Бракованный или неиспользованный/недоиспользованный ветеринарный препарат уничтожается в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом в сфере обращения ветеринарных препаратов.

### Глава 2 «Порядок применения ветеринарного препарата, кормовой добавки».

#### Применение

Кальценон назначают с целью профилактики и лечения сельскохозяйственных животных при:

— тетаниях (в период беременности, лактации, во время транспортировки, выпаса и т. д.);

— послеродовых парезах и парезах, вызванных недостатком кальция и фосфора;

— нарушении обмена кальция, фосфора, магния (рахит, остеодистрофия, остеомалация, беременность и др.);

— ацетонемии;

— отравлении свинцом, фтором, щавелевой кислотой (как вспомогательная терапия при комплексном лечении);

— токсикозе, аллергиях, геморрагическом диатезе, гематурии, гемоглобинурии.

### Дозировка

Дозировка и способы введения препарата представлены в таблице 1. Таблица 1.

| Вид животного                                                  | Доза в мл на одно животное | Способ введения                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| лошади с массой тела до 500 кг                                 | 80–100                     | внутривенно                                |
| крупный рогатый скот с массой тела до 500 кг (любого возраста) | 80–100                     | внутривенно, внутримышечно, подкожно       |
| овцы, козы                                                     | 15–25                      | внутривенно, внутримышечно, подкожно       |
| свиньи                                                         | 15–25                      | внутривенно, внутримышечно                 |
| поросята                                                       | 2–3                        | внутримышечно, дважды с интервалом 24 часа |

Кальценон назначают животным однократно. Допускается повторное применение препарата через 24 часа в тех же дозах.

Крупному рогатому скоту подкожно нельзя вводить в одно и то же место более 50 мл препарата, внутримышечно — более 25 мл. Овцам и козам внутримышечно в одно и то же место нельзя вводить более 15 мл препарата. Внутривенно препарат вводят медленно и равномерно.

### Противопоказания

Противопоказан при гиперкальциемии, ацидозе, тяжелых нарушениях функций почек, мерцательной аритмии предсердий, повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Кальценон не рекомендуется назначать животным одновременно с препаратами дигиталиса, витамином D и его аналогами.

### Побочные действия

Данные отсутствуют.

### Предостережения

При гиперкальциемии (передозировке) могут наблюдаться: анорексия, боли в мышцах, тошнота, рвота, жажда, полиурия. В особо тяжелых случаях гиперкальциемия может вызвать брадикардию и аритмию. Специфический антидот отсутствует. Лечение симптоматическое.

### Для ветеринарного применения!

**Владелец регистрационного удостоверения и производитель готового продукта:**

ПАО «Галичфарм», Украина, 79024, г. Львов, ул. Опришковская, 6/8. Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции: ТОО «ТД Фармамед».

РК, г. Алматы, улица Ходжанова, здание 67, н.п. 4а (5 этаж)

Тел.: +7 (727) 344-99-05/06

E-mail: Almaty@pharmamed-arterium.kz

Адрес организации, принимающей на территории Российской Федерации претензии от потребителей по качеству продукции: Представительство Корпорации «АРТЕРИУМ» в Российской Федерации. Адрес: 109004, г. Москва, ул. Таганская, 3, офис 509-510.

Тел. (495) 640 20 02

E-mail: Moscow@arterium.ru