

Инструкция рассмотрена и одобрена на заседании
Ветбиофармсовета
Минсельхозпрода Республики Беларусь
Протокол № 44 от 17.12.2008

ИНСТРУКЦИЯ по применению «Сенсиблекс®» (Sensiblex®)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Сенсиблекс® лекарственный препарат в форме раствора для инъекций, предназначенный для регуляции родового процесса у коров и сук.
- 1.2 Сенсиблекс® в качестве действующего вещества содержит денаверина гидрохлорид (40,0 мг/см³), а также вспомогательные компоненты: бензиловый спирт (консервант), пропилен гликоль (растворитель), раствор соляной кислоты (для коррекции уровня pH), воду для инъекций.
- 1.3 По внешнему виду Сенсиблекс® представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.
- 1.4 Выпускают препарат в форме раствора для инъекций, расфасованным по 10,0, 20,0 и 50,0 см³ в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками.
- 1.5 Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 8°C до плюс 25°C.
- 1.6 Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления, после вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 28 дней при соблюдении условий асептики. Запрещается использовать препарат после окончания его срока годности.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Входящий в состав препарата Сенсиблекс® денаверин гидрохлорид представляет собой антиспазматическое средство. Он оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру шейки матки и способствует увеличению эластичности родовых путей. Кроме того, денаверин гидрохлорид обладает анестезирующим, легким, транквилизирующим и жаропонижающим действиями. Релаксация мышц сохраняется до нескольких часов, а анальгетическое действие - не более 90 минут. Наибольший фармакологический эффект наблюдается при его применении в конце фазы открытия родовых путей.
- 2.2 Денаверин гидрохлорид не обладает кумулятивными свойствами и выводится из организма животных в виде метаболитов в течение 24 часов.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1 Сенсиблекс® применяют для регуляции родового процесса у коров и сук (при недостаточном открытии или узости шейки матки, при неправильном расположении плода, для активизации прерванных родов при слабой функции родовых путей, вызванной гипотонией матки, для ограничения риска повреждений родовых путей, а также при проведении фетотомии). В случае фетотомии требуется дополнительная эпидуральная анестезия.
- 3.2 Препарат Сенсиблекс® вводят животным внутримышечно или подкожно в дозах:
- первотелкам 5,0 - 10,0 см³/гол (200 - 400 мг/гол по ДВ);
 - коровам второго отела и старше - 10,0 см³/гол (400 мг/гол по ДВ);
 - собакам 0,5 - 1,5 см³/гол (20-60 мг/гол по ДВ) (возможно с 3 - 10 ед. окситоцина).
- 3.3 Действие препарата Сенсиблекс® начинается через 5-10 минут и полностью проявляется через 20 минут после введения.

В случае необходимости, инъекция Сенсиблекс® может быть повторена после 40 - 60 минут в той же дозе.

3.4 При применении препарата Сенсиблекс® в соответствии с Инструкцией побочных эффектов и осложнений не наблюдается.

3.5 Препарат Сенсиблекс® не рекомендуется применять с окситоцином, так как он ослабляет действие данного препарата.

3.6 Применение препарата Сенсиблекс® на ранней стадии родов не эффективно и назначение его в эти сроки неоправданно.

3.7 Мясо и молоко от коров после применения Сенсиблекс® можно использовать в пищевых целях через 24 часа после последнего введения препарата.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать общие требования безопасности, предъявляемые к работе с лекарственными препаратами.

4.2 Препарат следует хранить в местах недоступных для детей.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19^а и изготовителю. Одновременно в Белорусский государственный ветеринарный центр высылают не менее 3 невскрытых флаконов препарата данной серии с подробным описанием осложнений.

Инструкция по применению препарата подготовлена компанией «Вейкс-Фарма ГмбХ», Soehreweg, 6, Schwarzenborn 34639, Германия, дополнена и разработана на основании материалов сотрудниками кафедры акушерства, гинекологии и биотехники размножения животных (Р.Г. Кузьмич и Д.С. Ятусевич) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».

Производитель - «Вейкс-Фарма ГмбХ», Soehreweg, 6, Schwarzenborn 34639, Германия.

