

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Сергона

для стимуляции половой охоты и полиовуляции у самок сельскохозяйственных животных и сук

(организация-разработчик: «Bioveta, a.s.» / АО «Биовета», ул. Коменского 212, 683 23, г. Ивановице на Гане, Чешская Республика)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Сергон.
Международное непатентованное наименование: гонадотропин сыворотки жеребых кобыл.

2. Лекарственная форма: лиофилизат с растворителем для приготовления раствора для инъекций.

Препарат представляет собой лиофилизат с растворителем для приготовления раствора для инъекций. Лيوфилизат в 1 флаконе вместимостью 2, 6, 10 мл в качестве действующего вещества содержит гонадотропина сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК) с активностью соответственно 1000 МЕ, 3000 МЕ и 5000 МЕ, а в качестве вспомогательных веществ – метилпарабен, пропилпарабен, декстран 70.

Растворитель в 1 мл содержит хлорид натрия – 8,34 мг, хлорид калия – 0,21 мг, натрия – гидрогенфосфата 2,47 мг, калия гидрогенфосфата – 0,21 мг и воду для инъекций до 1 мл.

3. По внешнему виду представляет собой лиофилизированный порошок от белого до сероватого цвета. Растворитель по внешнему виду представляет собой – прозрачный бесцветный раствор. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства. Готовый раствор должен быть использован в течение 24 часов. Запрещается применять Сергон по истечении срока годности.

4. Лيوфилизат выпускают расфасованным в стеклянные флаконы по 2, 6, 10 мл, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками, растворитель – по 2, 6, 10 мл.

Комплект лиофилизата с растворителем упаковывают в картонную пачку индивидуально или по 5 флаконов.

Каждую единицу упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 8 °С до 15 °С, готовый раствор – от 2 °С до 8 °С.

6. Сергон следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Сергон отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Сергон относится к гормональным лекарственным препаратам.

10. Гонадотропин сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК), входящий в состав препарата, по своим фармакологическим свойствам близок к гипофизарным гонадотропинам: фолликулостимулирующему (ФСГ) и лютеинизирующему (ЛГ) гормонам. Гонадотропин стимулирует рост и развитие фолликулов у самок сельскохозяйственных животных. После введения препарата гонадотропин быстро всасывается в кровь и воздействует на органы-мишени. Максимальная концентрация действующего вещества в крови достигается через 2 – 3 часа и удерживается на терапевтическом уровне в течение 6 часов после однократного введения. Гонадотропин метаболизируется в печени и почках и выводится с мочой.

По степени воздействия на организм относится к умеренно-опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Сергон применяют для стимуляции половой охоты и полиовуляции у самок сельскохозяйственных животных и сук.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к гонадотропинам.

13. Лекарственный препарат применяют животным однократно внутримышечно или подкожно.

Перед применением содержимое флакона с лиофилизатом с активностью 1000 ME, 3000 ME, 5000 ME растворяют соответственно в 2, 6 или 10 мл растворителя. В 1 мл полученного раствора содержится гонадотропин с активностью 500 ME. Для стимуляции половой охоты и полиовуляции Сергон вводят коровам и телкам в дозе 1000 – 3000 ME; свиноматкам – 500 – 1000 ME; овцам и козам – 500 ME; сукам – 250 – 500 ME; крольчихам – 25 – 50 ME.

Свиноматкам для индукции полиовуляции Сергон вводят на 1 – 2 день эструса; для стимуляции половой охоты – после опороса через 10 дней после отъема поросят. Стимуляция половой охоты у ремонтных свинок разрешается при достижении 6 месяцев, или при живой массе не менее 90 кг. Для стимуляции половой охоты овцам и козам рекомендуется вводить Сергон сразу после удаления интравагинального устройства с прогестероном.

Стимуляция половой охоты у крольчих разрешается при достижении 6 месяцев.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия препаратов при первом применении или отмене не выявлено.

16. Сергон противопоказан беременным животным, а также не достигшим половой зрелости, с заболеванием репродуктивных органов.

17. Препарат применяют однократно.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления у животных признаков анафилактической реакции при введении Сергона им вводят подкожно холиномиметики, антигистаминные средства, кофеин в соответствии с инструкциями по их применению.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Убой животных на мясо и использование продукции животноводства в пищевых целях

после применения Сергона разрешается через 24 часа после последнего введения лекарственного средства.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Сергон следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Сергоном.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случаях появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Haně, Czech Republic / АО «Биовета», ул. Коменского 212, 683 23, Ивановице на Гане, Чешская республика

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Haně, Czech Republic / АО «Биовета», ул. Коменского 212, 683 23, Ивановице на Гане, Чешская республика, тел.: +420 517 318 502

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Сергона, утвержденная Россельхознадзором 30 августа 2010 г.

Номер регистрационного удостоверения: 203-3-13.15-3006 №ПВИ-3-7.0/03246



V SERG 004061

bioveta

