

Инструкция

по применению ветеринарного препарата «Фенилджект»

Описание

Фенилджект Нидерланды, 100 мл — прозрачный раствор, светло-желтого цвета.

Относится к группе нестероидных противовоспалительных средств.

Применяют Фенилджект при миозитах, артритах, бурситах, тендинитах, тендовагинитах, невритах, суставном и мышечном ревматизме, а также при болях, вызванных поражением периферических нервов у крупного рогатого скота, телят, коз, овец и свиней.

Препарат используют как анальгезирующее средство при послеродовых осложнениях (парез), в сочетании с общетерапевтическими средствами.

Высокоэффективно применение Фенилджект при воспалительных процессах вымени, особенно на поздних стадиях развития мастита (катаральный, фибринозный, гнойный), параллельно следует устранить причину, вызвавшую мастит, а при наличии патогенной микрофлоры назначить антибиотикотерапию.

Препарат используют при лечении воспалительных процессов различной этиологии и локализации, как нестероидные противовоспалительные средства.

Следует помнить, что воспаление — это защитная реакция организма, и подавление ее необходимо в случаях, когда воспаление оказывает вредное действие или приобретает хронический характер.

Состав

В 1 мл раствора:

Фенилбутазон — 200 мг

Наполнитель — до 1 мл

Фармакологические свойства

Фенилбутазон относится к группе нестероидных противовоспалительных средств.

Механизм действия препарата заключается в угнетении синтеза простагландинов (медиаторов воспалительной реакции) из арахидоновой кислоты путем ингибирования фермента циклооксигеназы.

Противовоспалительный эффект выражается в подавлении фазы экссудации и пролиферации в очаге воспаления, фенилбутазон уменьшает синтез коллагена и связанное с этим склерозирование тканей.

Анальгезирующий эффект связан с нарушением проведения болевых импульсов в спинном мозге.

В отличие от наркотических анальгетиков фенилбутазон не угнетает дыхательный центр, не вызывает лекарственную зависимость и не обладает спазмогенным действием.

Жаропонижающий эффект проявляется только при лихорадке, не влияя на нормальную температуру тела.

Противопоказания

Не рекомендуется применение препарата новорожденным и животным, которые чувствительны к препарату.

Не рекомендуется использование препарата совместно с сульфаниламидами и диуретиками, из-за образования устойчивых комплексов фенилбутазона с белками плазмы, что может привести к повышению концентрации лекарственных веществ в крови и как следствие к передозировке и интоксикации организма.

Побочные эффекты

Возможны расстройства желудочно-кишечного тракта (диспепсия), которые проходят после завершения курса лечения.

Дозировка

Фенилджект вводят внутримышечно (при сепсисе возможно введение препарата внутривенно с особой осторожностью и очень медленно).

Крупному рогатому скоту: 1 мл на 20 кг живой массы один раз в сутки в течение 3 дней.

Телятам, козам, овцам, свиньям: 1 мл на 10 кг живой массы один раз в сутки в течение 3 дней.

На одно инъекционное место крупному рогатому скоту следует вводить не более 15 мл, телятам и свиньям — не более 10 мл, а мелкому рогатому скоту — не более 5 мл препарата.

Период полного выведения препарата из организма животных: мясо — 12 дней молоко — 4 дня.

Хранение

Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре 15 — 25 °С.

Форма выпуска

Флаконы из темного стекла по 100 мл.

Производитель

Эстония